

CPT-11+Cet

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....8.....14
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1,8
②	アロキシ(0.75mg) デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) 生理食塩水	1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1,8
③	レスタミン(10mg)	5錠	経口	経口	②開始時	day 1,8
④	アービタックス(初回400mg/ m ²) 生理食塩水 (初回400ml)	250mg/m ² 200ml	点滴静注	側管	60分 初回: 120分	day 1,8
⑤	生理食塩水	100ml	点滴静注	側管	60分	day 1,8
⑥	5%ブドウ糖 イリノテカン	250ml 150mg/m ²	点滴静注	側管	90分	day 1
⑦						
⑧						

〈備考〉

2週を1クールとして繰り返す

アービタックスは初回のみ400mg/m²でinfusion reactionがあるためゆっくりと投与。
投与後生食100mlを1時間点滴して経過観察を行う。

2回目以降は250mg/m²で1時間で投与とする。