

FOLFIRI+Ramucirumab

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・3・・・・・・・・14
①	生理食塩水		ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1
②	ポララミン(5mg) アロキシ(0.75mg) デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	15分	day 1
③	サイラムザ 生理食塩水	8mg/kg 250ml	点滴静注	側管	60分	day 1
④	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
⑤	5%ブドウ糖 レボホリナート	250ml 200mg/m ²	点滴静注	主管	120分	day 1
⑥	5%ブドウ糖 イリノテカン	250ml 150mg/m ²	点滴静注	側管 (⑤と同 時)	120分	day 1
⑦	5%ブドウ糖 5FU	100ml 400mg/m ²	点滴静注	側管 (⑥終了 後連続 で)	15分	day 1
⑧	生理食塩水 5FU	全量で140ml 2400mg/m ²	インフュージョン ポンプ	主管	46時間	day 1-3
⑨	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day 3

〈備考〉

2週を1クールとして繰り返す インフュージョンポンプ使用

サイラムザは、0.2又は0.22ミクロンのフィルターを使用すること。

