

S-1+CPT-11(IRIS)(大腸)

〈対象疾患〉切除不能／進行再発 結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....15.....28
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1,15
②	アロキシ(0.75mg) 生理食塩水 デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg)	1V 100ml 1V	点滴静注	側管	30分	day 1,15
③	イリノテカン(CPT-11) 生理食塩水	100mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	90分	day 1,15
④	炭酸水素ナトリウム(重曹)	1.5g	経口	毎食後		day1-4,15-18
⑤	プリンペラン(5mg)	3T	経口	毎食後		day1-4,15-18
⑥	エスエーワン 1.25m ² > 40mg/回 1.25m ² ≤ <1.5m ² 50mg/回 1.5m ² ≤ 60mg/回	左記	経口	2回/日		day1より14日間連日 投与(14日間休薬)
⑦						
⑧						

〈備考〉

4週を1クールとして繰り返す。
IRISのレジメンではCPT-11 150mg/m²もある