

Xeloda+CDDP+Herceptin (XP+HER)

〈対象疾患〉進行・再発胃癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	投与日
①	ソルデム3A	1000ml	点滴静注	主管	6時間	day 1
②	ソルデム1	1000ml	点滴静注	主管 (終了後 止め)	4時間	day 2
③	生理食塩水 ハーセプチン	250ml 6mg/kg(2回目以降) (初回のみ8mg/kg)	点滴静注	②終了後 側管から 開始	30分(2回目以降) (初回のみ 90分)	day 2
④	イメンドCap(125mg)	1Cap		経口	シスプラチン投与 1時間前 に内服	day 2
⑤	アロキシ(0.75mg) デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) 生理食塩水	1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 2
⑥	生理食塩水 シスプラチン	400ml 80mg/m ²	点滴静注	側管	2時間	day 2
⑦	ヴィーンD	1000ml	点滴静注	主管 (⑥終了 後開始)	5時間	day 2
⑧	ソルデム3A	1000ml	点滴静注	主管	5時間	day 2
⑧	ソルデム3A	2000ml	点滴静注	主管	24時間	day 3
⑨	ソルデム3A	1000ml	点滴静注	主管	12時間	day 4
⑩	ゼローダ(300mg) 1.36m ² > 1200mg(4錠)/1回 1.36m ² ≤ <1.66m ² 1500mg(5錠)/1回 1.66m ² ≤ <1.96m ² 1800mg(6錠)/1回 1.96m ² ≤ 2100mg(7錠)/1回	左記		経口	2回 (朝、夕 食後)/ 日	Day2より14日間連 日投与 (7日間休薬)
⑪	イメンドCap(80mg) デカドロン錠(0.5mg)	80mg/日 8mg/日		経口	1回(朝食 後) 2回(朝、昼 食後)	day 3, 4 day 3, 4

〈備考〉

尿量測定を実施。400ml/6時間以下の場合には、ラシックス10mg静注。