

## XELOX+BEV

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	投与日
①	生理食塩水	50ml	ルートキープ・フラッシュ用	主管		day 1
②	アロキシ(0.75mg) デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) 生理食塩水	1V 1V 100ml	点滴静注	側管	15分	day 1
③	生理食塩水 アバスチン	100ml 7.5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 それ以降は60分	day 1
④	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食を使用	day 1
⑤	5%ブドウ糖 オキサリプラチン	500ml 130mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	2時間	day 1
⑥	ゼローダ 1.36m <sup>2</sup> > 1200mg/回 4錠 1.36m <sup>2</sup> ≤ <1.66m <sup>2</sup> 1500mg/回 5錠 1.66m <sup>2</sup> ≤ <1.96m <sup>2</sup> 1800mg/回 6錠 1.96m <sup>2</sup> ≤ 2100mg/回 7錠	左記		経口	2回/日	day1より14日間連日投与 (7日間休薬)
⑦						

〈備考〉

CVポートからの投与時は生食20mlで最後にフラッシュする。

ロペミン頓服を予防的に処方