

# PTX+CBDCA(TC療法)+BEV

〈対象疾患〉 卵巣癌(卵管癌・原発性腹膜癌を含む)

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

## 【1クール目】 TC療法のみ

|   | 薬品名  | 1日投与量                               | 手技                | 投与ルート | 投与時間<br>・速度 | 投与日<br>1.....21 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------|-------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水  | 100ml                               | ルートキープ・<br>フラッシュ用 | 主管    |             | day1            |
| ② | ボララミン(5mg)<br>パロノセトロン(0.75mg)<br>ガスター(20mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>アロカリス(235mg)<br>生理食塩水 | 1A<br>1V<br>1A<br>3V<br>1V<br>100ml | 点滴静注              | 側管    | 30分         | day1            |
| ③ | 生理食塩水  | 100ml                               | 点滴静注              | 側管    | 30分         | day1            |
| ④ | パクリタキセル<br>5%ブドウ糖  | 180mg/m <sup>2</sup><br>500ml       | 点滴静注              | 側管    | 3時間         | day1            |
| ⑤ | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖  | AUC6<br>250ml                       | 点滴静注              | 側管    | 1時間         | day1            |
| ⑥ | ヴィーンF  | 500ml                               | 点滴静注              | 側管    | 2時間         | day1            |

## 【2～最大6クール目】 TC療法+BEV

|   | 薬品名  | 1日投与量                               | 手技                | 投与ルート | 投与時間<br>・速度                      | 投与日<br>1.....21 |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水  | 100ml                               | ルートキープ・<br>フラッシュ用 | 主管    |                                  | day1            |
| ② | ボララミン(5mg)<br>パロノセトロン(0.75mg)<br>ガスター(20mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>アロカリス(235mg)<br>生理食塩水 | 1A<br>1V<br>1A<br>3V<br>1V<br>100ml | 点滴静注              | 側管    | 30分                              | day1            |
| ③ | 生理食塩水  | 100ml                               | 点滴静注              | 側管    | 30分                              | day1            |
| ④ | パクリタキセル<br>5%ブドウ糖  | 180mg/m <sup>2</sup><br>500ml       | 点滴静注              | 側管    | 3時間                              | day1            |
| ⑤ | カルボプラチン<br>5%ブドウ糖  | AUC6<br>250ml                       | 点滴静注              | 側管    | 1時間                              | day1            |
| ⑥ | ベバシズマブBS<br>生理食塩水  | 15mg/kg<br>100ml                    | 点滴静注              | 側管    | 初回90分<br>(2回目60分,以降<br>30分まで短縮可) | day1            |
| ⑦ | ヴィーンF(500ml)   | 500ml                               | 点滴静注              | 側管    | 2時間                              | day1            |

## 【7クール目以降】 BEV単独(HRD陽性の場合、オラパリブ併用)

|   | 薬品名               | 1日投与量            | 手技                | 投与ルート | 投与時間<br>・速度                | 投与日<br>1.....21 |
|---|-------------------|------------------|-------------------|-------|----------------------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水             | 100ml            | ルートキープ・<br>フラッシュ用 | 主管    |                            | day1            |
| ② | ベバシズマブBS<br>生理食塩水 | 15mg/kg<br>100ml | 点滴静注              | 側管    | 60分<br>(3回目以降30分<br>まで短縮可) | day1            |

〈備考〉

1～6クール目

【内服】デカドロン錠 4mg/日 day2.3 朝昼食後  
中等度催吐性(3剤)

パクリタキセル(L0:180mg/m<sup>2</sup>, L1:135mg/m<sup>2</sup>, L2:110mg/m<sup>2</sup>) カルボプラチン(L0:AUC6, L1:AUC5, L2:AUC4)  
カルボプラチンの投与量はカルバートの計算式(\*1)より算出。\*1)CBDCA投与量(mg/body)=目標AUC5×  
(GFR+25)

パクリタキセルは、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。  
点滴セットはDEHPフリーのものを用いること。

【内服】TC+BEV終了後、HRD陽性の場合オラパリブ併用  
オラパリブ(リムパーザ) 600mg/日 分2 day1より21日間連日投与:PAOLAレジメン