

PTX+CBDCA weekly (weeklyTC療法)

〈対象疾患〉子宮体癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・8・・・15・・・21
①	生理食塩水	100ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day1, 8, 15
②	ボララミン(5mg) パロノセトロン(0.75mg) ガスター(20mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1A 1V 1A 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day1
③	ボララミン(5mg) パロノセトロン(0.75mg) ガスター(20mg) デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 1A 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day8, 15
④	生理食塩水	100ml	点滴静注	側管	30分	day1, 8, 15
⑤	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	80mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	1時間	day1, 8, 15
⑥	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC6 250ml	点滴静注	側管	1時間	day1
⑦	ヴィーンF(500ml)	500ml	点滴静注	側管	2時間	day1, 8, 15

〈備考〉

※【内服】

デカドロン錠 4mg/日 day2.3 朝昼食後
中等度催吐性(3剤)

パクリタキセル(L0:80mg/m², L1:70mg/m², L2:60mg/m²) カルボプラチン(L0:AUC6, L1:AUC5, L2:AUC4)

カルボプラチンの投与量はカルバートの計算式(*1)より算出、GFRについてはCockcroft-Gaultの計算式より算出。*1)CBDCA投与量(mg/body)=目標AUC5×(GFR+25)