

## sLV5FU2＋Bev

〈対象疾患〉切除不能/進行再発 結腸・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・3・.....14
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1
②	デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1 V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水 ベバシズマブBS	100ml 5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 (2回目60分, 以降30分ま で短縮可)	day 1
④	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
⑤	5%ブドウ糖 レボホリナート	250ml 200mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	2時間	day 1
⑥	5%ブドウ糖 5FU	100ml 400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	側管	15分	day 1
⑦	生理食塩水 5FU	全量で140ml 2400mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	主管	46時間	day 1-3
⑧	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day 1. 3

〈備考〉

軽度催吐性

インフュージョンポンプ使用