

mFOLFOX6+Cet(Cet隔週投与)

〈対象疾患〉切除不能/進行再発 結腸・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....14
①	生理食塩水	50ml	ルートキープ・フラッシュ用	主管		day1
②	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	アービタックス 生理食塩水	500mg/ m ² 250ml	点滴静注	側管	120分	day1
④	生理食塩水	50 ml	点滴静注	側管	30分	day1
⑤	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/ m ² 250ml	点滴静注	主管	120分	day1
⑥	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/ m ² 250ml	点滴静注	側管 (⑤と同時に)	120分	day1
⑦	5FU 5%ブドウ糖	400mg/ m ² 100ml	点滴静注	側管 (⑥終了後 連続で)	15分	day1
⑧	5FU 生理食塩水	2400mg/ m ² 全量で140ml	インフュージョン ポンプ	主管	46時間	day1-3
⑨	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day1、3

〈備考〉

内服

デカ'ロン錠 4mg/日 Day2,3 朝・昼食後に投与
中等度催吐性(3剤)

アービタックスは500mg/ m²で投与。infusion reactionがあるため、ゆっくりと投与。

2週を1クールとして繰り返す
インフュージョンポンプ使用