

# ロンサーフ+Bev

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....15.....28
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1、15
②	生理食塩水 ベバシズマブBS	100ml 5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 (2回目60分、 以降30分ま で短縮可)	day 1、15
③						
④						
⑤						
⑥						
⑦						

〈備考〉

## 【内服】

ロンサーフ配合錠 下記の量 2回/日 day1-5、day8-12

( $1.07\text{m}^2 >$  35mg/回)

( $1.07\text{m}^2 \leq < 1.23\text{m}^2$  40mg/回)

( $1.23\text{m}^2 \leq < 1.38\text{m}^2$  45mg/回)

( $1.38\text{m}^2 \leq < 1.53\text{m}^2$  50mg/回)

( $1.53\text{m}^2 \leq < 1.69\text{m}^2$  55mg/回)

( $1.69\text{m}^2 \leq < 1.84\text{m}^2$  60mg/回)

( $1.84\text{m}^2 \leq < 1.99\text{m}^2$  65mg/回)

( $1.99\text{m}^2 \leq < 2.15\text{m}^2$  70mg/回)

( $2.15\text{m}^2 \leq$  75mg/回)

最小度催吐性