

FOLFIRI+Ramucirumab

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

| | 薬品名 | 1日投与量 | 手技 | 投与ルート | 投与時間・速度 | 投与日 1・・・3・・・・・・・・14 |
|---|---|-----------------------------------|---------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|
| ① | 生理食塩水 | | ルート キープ・ フラッシュ 用 | 主管 | | day 1 |
| ② | ポララミン パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水 | 1A 1V 1V 1V 100ml | 点滴静注 | 側管 | 30分 | day 1 |
| ③ | サイラムザ 生理食塩水 | 8mg/kg 250ml | 点滴静注 | 側管 | 60分 (2回目以降は30分まで短縮可) | day 1 |
| ④ | 生理食塩水 | 20ml | 静注 | 側管 | ①の生食を使用 | day 1 |
| ⑤ | 5%ブドウ糖 レボホリナート | 250ml 200mg/m ² | 点滴静注 | 主管 | 120分 | day 1 |
| ⑥ | 5%ブドウ糖 イリノテカン | 250ml 150mg/m ² | 点滴静注 | 側管 (⑤と同時) | 120分 | day 1 |
| ⑦ | 5%ブドウ糖 5FU | 100ml 400mg/m ² | 点滴静注 | 側管 (⑥終了後連続で) | 15分 | day 1 |
| ⑧ | 生理食塩水 5FU | 全量で140ml 2400mg/m ² | インフュージョン ポンプ | 主管 | 46時間 | day 1-3 |
| ⑨ | ポート用生食注シリンジ | 20ml | 静注 | 主管 | | day 1.3 |

〈備考〉

内服

デカドロン錠 4mg/日 day2.3 朝昼食後
中等度催吐性(3剤)

2週を1クールとして繰り返す インフュージョンポンプ使用

心機能低下では、サイラムザは60分とする。

サイラムザは、0.2又は0.22ミクロンのフィルターを使用すること。