

S-1+CPT-11(IRIS)+Cetuximab(Cmab)

〈対象疾患〉切除不能/進行再発 結腸・直腸癌

治療内容 (1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・8・・・15・・・22・・・28
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1, 8, 15, 22
②	ポララミン パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1A 1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1, 15
③	ポララミン デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 8, 22
④	アービタックス(初回400mg/㎡) 生理食塩水 (初回250ml)	250mg/㎡ 250ml	点滴静注	側管	60分 (初回 120分)	day 1, 8, 15, 22
⑤	生理食塩水	50ml	点滴静注	側管	30分	day 1, 8, 15, 22
⑥	イリノテカン 生理食塩水	125mg/㎡ 250ml	点滴静注	側管	90分	day 1, 15
⑦						
⑧						

〈備考〉

内服

エスエーワン 下記の量 2回/日 Day1より14日間連日投与(14日間休薬)して下さい。

1.25㎡ > 40mg/回

1.25㎡ ≤ < 1.50㎡ 50mg/回

1.50㎡ ≤ 60mg/回

デカロン錠 4mg/日 Day2,3,16,17 朝・昼食後に投与

中等度催吐性(3剤)

4週を1クールとして繰り返す。

大腸癌治療ガイドライン(2016年版)で示されたIRIS+BmabのCPT-11の用量(125mg/㎡)で記載

アービタックスは初回のみ400mg/㎡で投与。2回目以降は250mg/㎡で投与する。infusion reactionがあるためゆっくりと投与する。