

XELOX+Bev

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	投与日
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ用	主管		day 1
②	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水 ベバンズマブBS	100ml 7.5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 (2回目60分, 以降30分ま で短縮可)	day 1
④	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
⑤	5%ブドウ糖 オキサリプラチン	500ml 130mg/m ²	点滴静注	側管	2時間	day 1
⑥						
⑦						

〈備考〉

内服

ゼローダ錠 下記の量 2回/日 Day1より14日間連日投与(7日間休薬)して下さい。

1.36m²> 1200mg/回

1.36m²≤ <1.66m² 1500mg/回

1.66m²≤ <1.96m² 1800mg/回

1.96m²≤ 2100mg/回

デカトロン錠 4mg/日 Day2,3 朝・昼食後に投与
中等度催吐性(3剤)

CVポートからの投与時は生食20mlで最後にフラッシュする。