

PHESGO+DTX

〈対象疾患〉HER2陽性乳癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....21
①	フェスゴ配合皮下注	1V/body 初回:15mL IN 2回目以降:10mL MA	大腿部に皮下注射	皮下	初回:8分以上 2回目以降:5分以上	day 1
②	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ用	主管		day 1
③	デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
④	ドセタキセル 5%ブドウ糖	75mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	60分	day 1
⑤						
⑥						
⑦						
⑧						

〈備考〉

その他:

軽度催吐性

投与クール数

術前4回

転移再発6回以上

フェスゴ配合皮下注

【投与時の注意点】

*同一箇所へ繰り返し注射することは避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと

*大腿部以外への部位への投与は避けること

*皮膚が敏感な部位、皮膚に異常のある部位(傷、発疹、発赤、硬結等)には注射しないこと。

*フェスゴ単剤投与時は投与後15分経過観察

*投与時は室温に戻してから投与

【予定された投与が遅れた場合には、以下の通り投与することが望ましい】

・前回投与から6週間未満の時:維持投与量

・前回投与から6週間以上の時:初回投与量