

GEM+CDDP+S-1 (GCS療法)

〈対象疾患〉進行・再発胆道癌

治療内容 (1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....14
①	生理食塩水	50ml	ルートキープ・ フラッシュ用	主管		day1
②	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6. 6mg) 生理食塩水	1 V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day1
③	シスプラチン 生理食塩水	25mg/ m ² 500ml	点滴静注	側管	60分	day1
④	生理食塩水	500ml	点滴静注	側管	60分	day1
⑤	ゲムシタビン 生理食塩水	1000mg/ m ² 250ml	点滴静注	側管	30分	day1
⑥	ソルデム3A	500ml	点滴静注	側管	60分	day1
⑦						
⑧						

〈備考〉

【内 服】

エスエーワン下記の量 2回/日 day1より7日間連日投与(7日間休薬)

1.25m²> 40mg/回

1.25m² ≤ < 1.5m² 50mg/回

1.5m² ≤ 60mg/回

デカトロン錠 8mg/日 Day2,3 朝・昼食後に投与
中等度催吐性(2剤)

2週を1クールとして繰り返す