

FOLFIRINOX

〈対象疾患〉膵臓癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1...3.....14
①	生理食塩水	50ml	ルートキープ・フラッシュ用	主管		day1
②	アロカリス(235mg) パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1V 1V 1.5V 100ml	点滴静注	側管	30分	day1
③	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	85mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	120分	day1
④	レボホリナート 5%ブドウ糖	200mg/m ² 250ml	点滴静注	③終了後 主管	120分	day1
⑤	イリノテカン 生理食塩水	180mg/m ² 250ml	点滴静注	側管 (④開始 30分後、 一緒に)	90分	day1
⑥	5FU 生理食塩水	400mg/m ² 100ml	点滴静注	側管	15分	day1
⑦	5FU 生理食塩水	2400mg/m ² 全量で140ml	インフュージョン	主管	46時間	day1-3
⑧	ポート用生食注シリンジ	20ml	ルートキープ・フラッシュ用	主管		day1.3

〈備考〉

内服

デカドロン錠 Day2～4 8mg/日 朝昼食後

オランザピン錠 Day1～4 5mg/日 夕食後

※オランザピンは糖尿病及び糖尿病既往歴のある患者は禁忌になります。高齢者(75歳以上)は注意になりますので、症例に応じて適宜処方検討してください。

高度催吐性

2週を1クールとして繰り返す インフュージョンポンプ使用