

TG療法

〈対象疾患〉尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・8・・・15・・・28
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1、8、15
②	ボララミン(5mg) ガスター(20mg) パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1A 1A 1V 3V 50ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水	1A 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
④	デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) 生理食塩水	1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 8、15
⑤	パクリタキセル 生理食塩水	200mg/m ² 500ml	点滴静注	側管	3時間	day 1
⑥	ゲムシタビン 生理食塩水	1000mg/m ² 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1、8、15
⑦						
⑧						

〈備考〉

内服

デカロン錠 8mg/日 Day2,3朝・昼食後に投与
中等度催吐性(2剤)

パクリタキセル(タキソール)は、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。点滴セットはDEHPフリーのものを用いること。