

# GEM+CBDCA

〈対象疾患〉尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

|   | 薬品名  | 1日投与量                          | 手技                        | 投与ルート | 投与時間<br>・速度 | 投与日<br>1.....28 |
|---|--|--------------------------------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水  | 50ml                           | ルート<br>キープ・<br>フラッシュ<br>用 | 主管    |             | Day1, 2, 8, 15  |
| ② | デキサート(6. 6mg)<br>生理食塩水                                   | 1V<br>100ml                    | 点滴静注                      | 側管    | 30分         | Day1, 8, 15     |
| ③ | パロノセトロン(0.75mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>アロカリス(235mg)<br>生理食塩水 | 1V<br>1V<br>1V<br>100ml        | 点滴静注                      | 側管    | 30分         | Day2            |
| ④ | ゲムシタビン<br>生理食塩水  | 1000mg/m <sup>2</sup><br>100ml | 点滴静注                      | 側管    | 30分         | Day1, 8, 15     |
| ⑤ | カルボプラチン<br>生理食塩水   | AUC4or5<br>500ml               | 点滴静注                      | 側管    | 60分         | Day2            |
|   |  |                                |                           |       |             |                 |
|   |  |                                |                           |       |             |                 |
|   |  |                                |                           |       |             |                 |

〈備考〉

## 【内服】

デカドロン錠 4mg/日 day3,4 朝昼食後  
中等度催吐性(3剤)

カルボプラチンは、AUC4or5で使用。