

BEP療法

〈対象疾患〉精巣腫瘍(胚細胞腫瘍)

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・8・・・15・・・28
①	ソルデム3A	1000mL	点滴静注	主管	12時間	day2-6
②	ソルデム3A	500mL	点滴静注	主管	6時間	day1-6
③	生理食塩液	50mL	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day8、15
④	ブレオ 生理食塩水	30mg 100ml	点滴静注	側管	全開で	day1-5、8、15
⑤	グラニセロン静注(3mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩液	1A 1V 1V 100mL	点滴静注	側管	30分	day1
⑥	グラニセロン静注(3mg) デキサート(6.6mg) 生理食塩液	1A 1V 100mL	点滴静注	側管	30分	day2-5
⑦	エトポシド 生理食塩液	100mg/m ² 500mL	点滴静注	側管	2時間	day1-5
⑧	シスプラチン静注 ヴィーンF輸液	20mg/m ² 500mL	点滴静注	側管	2時間	day1-5
⑨	ソルデム3A	500mL	点滴静注	主管	6時間	day1-6
⑩	フロセミド注 ヴィーンF輸液	1V 500mL	点滴静注	側管	2時間	day1-5
⑪	ビタメジン静注 ヴィーンF輸液	1V 500mL	点滴静注	側管	2時間	day1-5

〈備考〉

【内服】

中等度催吐性(3剤)