

# CDDP+EPI 動注療法

〈対象疾患〉前立腺癌・尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....21
①	ヴィーンF	500ml	点滴静注	主管	5時間	day 1
②	グラニセトロン(3mg) デキサメタゾン(デキサート) (6.6mg) ソルデム3AG	1A 1V 200ml	点滴静注	側管	1時間 (出棟1時間 前開始)	day 1
③	シスプラチン	50mg/m <sup>2</sup>	動注	カテーテル	数分	day 1
④	エピルビシン 生理食塩水	30mg/m <sup>2</sup> 50ml	動注	カテーテル	数分	day 1
⑤	塩酸メクロプラミド ラクテック	1A 500ml	点滴静注	主管	2時間	day 1
⑥	塩酸メクロプラミド ヴィーン3G	1A 500ml	点滴静注	主管	3時間	day 1
⑦	ソルデム3A ヴィーン3G	500ml 500ml	点滴静注	主管	10時間	day 1
⑧	5%ブドウ糖	500ml	点滴静注	主管	明朝まで ゆっくり	day 1

〈備考〉

## 【内 服】

- ★ day1 アプレピタントCap(125mg) 1回1Cap 1日1回(シスプラチン開始60分前)
- ★ day2-4 アプレピタントCap(80mg) 1回1Cap 1日1回(朝食後)