

GEM+CDGP

〈対象疾患〉尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 21日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 0・1・2・・・8・・・・21
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ用	主管		Day 1, 2, 8
②	グラニセトロン(3mg) デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	Day 1, 8
③	ジェムザール 生理食塩水	1000mg/m ² 100ml	点滴静注	側管	30分	Day 1, 8
④	ヴィーンF 塩酸メトクロプラミド	500ml 1A	点滴静注	側管	2時間	Day 2
⑤	グラニセトロン(3mg) 生理食塩水	1A 100ml	点滴静脈	側管	30分	Day 2
⑥	アクプラ 生理食塩水	80mg/m ² 500ml	点滴静注	側管	2時間	Day 2
⑦	ソルデム3A	500ml	点滴静注	主管	2時間	Day 2
⑧	5%ブドウ糖 塩酸メトクロプラミド	500ml 1A	点滴静注	主管	3時間	Day 2

〈備考〉

【内 服】

★ day2 アプレピタントCap(125mg) 1回1Cap 1日1回(アクプラ開始60分前)

★ day3-4 アプレピタントCap(80mg) 1回1Cap 1日1回(朝食後)