

TGP(N)

〈対象疾患〉尿路上皮癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 0●1●2●●8●●●●28
①	ヴィーンF 塩酸メクロプラミド	500ml 1A	点滴静注	主管	2時間	Day 1, 2, 8
②	グラニセトロン(3mg) デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 100ml	点滴静脈	側管	30分	Day 1, 2, 8
③	パクリタキセル(タキソール) 生理食塩水	80mg/ m ² 500ml	点滴静脈	側管	3時間	Day 1, 8
④	ジェムザール 生理食塩水	1000mg/ m ² 100ml	点滴静注	側管	30分	Day 1, 8
⑤	アクプラ 生理食塩水	70mg/ m ² 500ml	点滴静注	側管	2時間	Day 2
⑥	ソルデム3A 塩酸メクロプラミド	500ml 1A	点滴静注	主管 (アクプラ終了後 開始)	3時間	Day 2
⑦	グラニセトロン(3mg) 生理食塩水	1A 100ml	点滴静注	主管	30分	Day 2
⑧	5%ブドウ糖	500ml	点滴静注	主管	3時間	Day 2

〈備考〉

4週を1クールとして繰り返す。

パクリタキセル(タキソール)は、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。点滴セットはDEHPフリーのものを用いること。