

<治療内容（1コース＝21日）>

治療レジメン名： パクリタキセル/イホマイド/シスプラチン療法（TIP療法）																				
対象疾患： 陰茎癌																				
治療開始日：                      年                      月                      日 ～																		コース目		
Day	1	2	3	.....																21
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル(PTX)	●																			
175mg/m <sup>2</sup> （点滴3時間）																				
イホマイド(IFM)	●	●	●																	
1,200mg/m <sup>2</sup> （点滴2時間）																				
シスプラチン(ODDP)	●	●	●																	
25mg/m <sup>2</sup> （点滴2時間）																				

Day1（     /     ）

予定時間	No.	主管	側管① (Day1はフィルター付ルートで)	側管②	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)				主	:	
:	②	止め(ルートキープ)	ハロセトロン(0.75mg) 1V 生理食塩水 100ml 点滴(30分)			側	:	
:	③		イホマイド 1200mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間)	ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド開始時)		側 薬剤部混注	:	
:	④	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)				主	:	
:	⑤	止め(ルートキープ)	ガスター(20mg) 1A デキサメタゾン(デキサー ト)(6.6mg) 1V 生理食塩水 50ml 点滴(15分)		レスタミン5錠	側	:	
:	⑥		パクリタキセル(タキソール) 175mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(3時間)			側 薬剤部混注	:	
:	⑦		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与4時間後)		アプレピタントCap125mg1Cap (シスプラチン投与1時間 前)	側	:	
:	⑧		シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間)			側 薬剤部混注	:	
:	⑨		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与8時間後)			側	:	
:	⑩	塩酸マクロプラスト 1A ソルデム3A 500ml 点滴(6時間)				主	:	
:	⑪	ヴィーンF 500ml 点滴(翌朝までゆっくり キープ)				主	:	

## Day2(     /     )

予定 時間	No.	主管	側管①	側管②	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)			アプレピタントCap80mg 1Cap デカドロン錠0.5mg 8T 朝食後	主	:	
:	②	止め(ルートキープ)	イホマイド 1200mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間) (バックプライミング)	ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド開始時)		側 薬剤部混注 側	:	
:	③	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)				主	:	
:	④	止め(ルートキープ)	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間) (バックプライミング)			側 薬剤部混注	:	
:	⑤		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与4時間後)			側	:	
:	⑥	塩酸マクロプラスト <sup>®</sup> 1A ソルデム3A 500ml 点滴(6時間)			デカドロン錠0.5mg 8T 昼食後	主	:	
:	⑦		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与8時間後)			側	:	
:	⑧	ヴィーンF 500ml 点滴(翌朝までゆっくり キープ)				主	:	

## Day3(     /     )

予定 時間	No.	主管	側管①	側管②	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)			アプレピタントCap80mg 1T デカドロン錠0.5mg 8T 朝食後	主	:	
:	②	止め(ルートキープ)	イホマイド 1200mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間) (バックプライミング)	ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド開始時)		側 薬剤部混注 側	:	
:	③	メイロン静注7%20ml ソルデム3A 500ml 点滴(90分)				主	:	
:	④	止め(ルートキープ)	シスプラチン 25mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 500ml 点滴(2時間) (バックプライミング)			側 薬剤部混注	:	
:	⑤		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与4時間後)			側	:	

：	⑥	塩酸マクロプラミド 1A ソルデム3A 500ml 点滴(6時間)			デカドロン錠0.5mg 8T 昼食後	主	：	
：	⑦		ウロミテキサン 400mg/m <sup>2</sup> 生理食塩水 20ml 静注 (イホマイド投与8時間後)			側	：	
：	⑧	ヴィーンF 500ml 点滴 (翌朝までゆっくりキープ)				主	：	

＜注意事項＞

- ・パクリタキセル(タキソール)は、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。点滴セットはDEHPフリーのものを用いること。
- ・ウロミテキサンは、イホマイド投与時・4時間後・8時間後に投与。(出血性膀胱炎の予防のため)
- ・day2・day3のイホマイド、シスプラチン開始時はバックプライミングをしてから、抗癌剤のボトルにルートを接続する。

＜主な副作用＞

骨髄抑制  
 出血性膀胱炎(開始2～5日後)・腎障害  
 末梢神経障害・関節痛  
 脱毛  
 悪心嘔吐  
 過敏症  
 血管外漏出 パクリタキセル(壊死性抗癌剤)／イホマイド・シスプラチン(炎症性抗癌剤)  
 間質性肺炎など