

<治療内容(1コース=21日)>

治療レジメン名: パクリタキセル/シスプラチン/フルオロウラシル療法(TPF療法)																		
対象疾患: 陰茎癌																		
治療開始日: 年 月 日 ~														コース目				
Day	1	2	3	4	5												21
日付	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
パクリタキセル(PTX)	●																	
120mg/m ² (点滴3時間)																		
シスプラチン(CDDP)	●	●																
50mg/m ² (点滴2時間)																		
フルオロウラシル(5-FU)		●	●	●	●													
1000mg/m ² (持続点滴24時間)																		

Day1(/)

予定 時間	No.	主管	側管	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	塩酸メトクロプラミド1A ヴィーンF 500ml 点滴(2時間)			主	:	
:	②	生理食塩水 50ml (ルートキープ・フラッシュ用)			主	:	
:	③		ポララミン(5mg) 1A パロノセトロン(0.75mg) 1A ガスター(20mg) 1A デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 2V 生理食塩水 100ml 点滴(30分)		側	:	
:	④		パクリタキセル 120mg/m ² 生理食塩水 500ml 点滴(3時間)	アプレピタントCap125mg (シスプラチン投与1時間前)	側 薬剤部混注	:	
:	⑤		シスプラチン 50mg/m ² 生理食塩水 500ml 点滴(2時間)		側 薬剤部混注	:	
:	⑥		塩酸メトクロプラミド 1A ソルデム3A 500ml 点滴(3時間)		側	:	
:	⑦		5%ブドウ糖 500ml 点滴(3時間)		側	:	

Day2(/)

予定 時間	No.	主管	側管	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	塩酸メクロプラミド1A ヴィーンF 500ml 点滴(2時間)		アフレビタントCap80mg 朝食後	主	:	
:	②	5-FU 1000mg/m ² 生理食塩水 1000ml 持続点滴(24時間)	デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 1V 生理食塩水 100ml 点滴(30分)		主 薬剤部混注	:	
:	③		シスプラチン 50mg/m ² 生理食塩水 500ml 点滴(2時間)		側	:	
:	④		塩酸メクロプラミド 1A ソルデム3A 500ml 点滴(3時間)		側	:	
:	⑤		5%ブドウ糖 500ml 点滴(3時間)		側	:	

Day3(/)

予定 時間	No.	主管	側管	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	5-FU 1000mg/m ² 生理食塩水 1000ml 持続点滴(24時間)	デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 1V 生理食塩水 100ml 点滴(30分)	アフレビタントCap80mg 朝食後	主 薬剤部混注	:	
:	②				側	:	
:			生理食塩水 1500ml 点滴(6時間)		側	:	

Day4, 5(/)

予定 時間	No.	主管	側管	内服	混注者 サイン	実施 時間	実施者 サイン
:	①	5-FU 1000mg/m ² 生理食塩水 1000ml 持続点滴(24時間)	デキサメタゾン(デキサート)(6.6mg) 1V 生理食塩水 100ml 点滴(30分)		主 薬剤部混注	:	
:	②				側	:	
:			生理食塩水 1500ml 点滴(6時間)		側	:	

<注意事項>

・パクリタキセル(タキソール)は、0.22ミクロン以下のメンブランフィルターを用いたインラインフィルターを通して投与すること。点滴セットはDEHPフリーのものをを用いること。