

FOLFIRI+Cet

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・3・5・7・9・11・13
①	生理食塩水	50ml	ルートキー プ・フラッ シュ用	主管		day 1, 8
②	ポララミン パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1A 1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	ポララミン デキサート(6.6mg) 生理食塩水	1A 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 8
④	アービタックス(初回400mg/m ²) 生理食塩水	250mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	60分 初回: 120分	day 1, 8
⑤	生理食塩水	50ml	点滴静注	側管	30分	day 1, 8
⑥	5%ブドウ糖 レボホリナート	250ml 200mg/m ²	点滴静注	主管	120分	day 1
⑦	5%ブドウ糖 イリノテカン	250ml 150mg/m ²	点滴静注	側管 (⑥と同 時)	120分	day 1
⑧	5%ブドウ糖 5FU	100ml 400mg/m ²	点滴静注	側管 (⑦終了 後連続 で)	15分	day 1
⑨	生理食塩水 5FU	全量で140ml 2400mg/m ²	インフュージョン	主管	46時間	day 1-3
⑩	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day 1, 3

〈備考〉

内服

デカドロン錠 4mg/日 day2,3 朝食後

中等度催吐性(3剤)

2週を1クールとして繰り返す

インフュージョンポンプ使用

アービタックスは初回のみ400mg/m²でinfusion reactionがあるためゆっくりと投与。

2回目以降は250mg/m²で1時間で投与とする。