

FOLFIRI+Panitumumab (Pmab)

〈対象疾患〉切除不能／進行再発 結腸・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間・速度	投与日 1.....14
①	生理食塩水	100ml	ルート キープ・ フラッシュ 用	主管		day 1
②	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
④	生理食塩水 ベクティビックス	100ml 6mg/kg	点滴静注	側管	60分	day 1
⑤	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
⑥	5%ブドウ糖 レボホリナート	250ml 200mg/m ²	点滴静注	主管	2時間	day 1
⑦	5%ブドウ糖 イリノテカン	250ml 150mg/m ²	点滴静注	側管 (⑥と同 時)	2時間	day 1
⑧	5%ブドウ糖 5FU	100ml 400mg/m ²	点滴静注	側管 (⑦終了 後連続 で)	15分	day 1
⑨	生理食塩水 5FU	全量で140ml 2400mg/m ²	インフュージョン	主管	46時間	day 1-3
⑩	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day 1. 3
⑪						

〈備考〉

内服
デカ'ロン錠 4mg/日 Day2,3 朝昼食後に投与
中等度催吐性(3剤)
ベクティビックスはインラインフィルター使用