

S-1+CPT-11(IRIS)+Bev

〈対象疾患〉切除不能／進行再発 結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 28日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1.....15.....28
①	生理食塩水	50ml	ルート キープ・ フラッシュ用	主管		day 1,15
②	パロノセトロン(0.75mg) デキサート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1,15
③	生理食塩水 ベバシズマブBS	100ml 5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 (2回目60 分,以降30 分まで短 縮可)	day1,15
④	イリノテカン 生理食塩水	125mg/m ² 250ml	点滴静注	側管	90分	day 1,15
⑤						
⑥						
⑦						
⑧						

〈備考〉

内服

エスエーワン 下記の量 2回/日 Day1より14日間連日投与(14日間休薬)して下さい。

1.25m²> 40mg/回

1.25m²≤ <1.50m² 50mg/回

1.50m²≤ 60mg/回

デカトロン錠 4mg/日 Day2,3,16,17 朝・昼食後に投与

中等度催吐性(3剤)

4週を1クールとして繰り返す。

大腸癌治療ガイドライン(2016年版)で示されたIRIS+BmabのCPT-11の用量(125mg/m²)で記載

CPT-11: 150mg/m² 3週1Kr、100mg/m² 4週1Krの用量もある(TRICOLORE試験)