

## mFOLFOX6+Panitumumab (Pmab)

〈対象疾患〉 切除不能／進行再発 結腸・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

|   | 薬品名  | 1日投与量                             | 手技                    | 投与ルート                   | 投与時間<br>・速度 | 投与日<br>1.....14 |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-----------------|
| ① | 生理食塩水  | 100ml                             | ルートキー<br>プ・フラッ<br>シュ用 | 主管                      |             | day 1           |
| ② | パロノセトロン(0.75mg)<br>デキサート(6.6mg)<br>アロカリス(235mg)<br>生理食塩水 | 1V<br>1V<br>1V<br>100ml           | 点滴静注                  | 側管                      | 30分         | day 1           |
| ③ | 生理食塩水  | 20ml                              | 静注                    | 側管                      | ①の生食<br>を使用 | day 1           |
| ④ | 生理食塩水<br>ベクティビックス  | 100ml<br>6mg/kg                   | 点滴静注                  | 側管                      | 60分         | day 1           |
| ⑤ | 生理食塩水  | 20ml                              | 静注                    | 側管                      | ①の生食<br>を使用 | day 1           |
| ⑥ | 5%ブドウ糖<br>レボホリナート  | 250ml<br>200mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注                  | 主管                      | 2時間         | day 1           |
| ⑦ | 5%ブドウ糖<br>オキサリプラチン                                       | 250ml<br>85mg/m <sup>2</sup>      | 点滴静注                  | 側管<br>(⑥と同<br>時)        | 2時間         | day1            |
| ⑧ | 5%ブドウ糖<br>5FU  | 100ml<br>400mg/m <sup>2</sup>     | 点滴静注                  | 側管<br>(⑦終了<br>後連続<br>で) | 15分         | day 1           |
| ⑨ | 生理食塩水<br>5FU   | 全量で140ml<br>2400mg/m <sup>2</sup> | インフュージョン              | 主管                      | 46時間        | day 1-3         |
| ⑩ | ポート用生食注シリンジ  | 20ml                              | 静注                    | 主管                      |             | day 1. 3        |
| ⑪ |  |                                   |                       |                         |             |                 |

〈備考〉

内服  
デカトロン錠 4mg/日 Day2,3 朝昼食後に投与  
中等度催吐性(3剤)  
ベクティビックスはインラインフィルター使用