

FOLFIRI+BEV

〈対象疾患〉結腸癌・直腸癌

治療内容(1クール期間: 14日・総クール数: 回)

	薬品名	1日投与量	手技	投与ルート	投与時間 ・速度	投与日 1・・・3・・・・・・14
①	生理食塩水	50ml	ルートキー プ・フラッ シュ用	主管		day 1
②	パロノセトロン(0.75mg) デキササート(6.6mg) アロカリス(235mg) 生理食塩水	1V 1V 1V 100ml	点滴静注	側管	30分	day 1
③	生理食塩水 ベバシズマブBS	100ml 5mg/kg	点滴静注	側管	初回90分 (2回目60分, 以降30分ま で短縮可)	day 1
④	生理食塩水	20ml	静注	側管	①の生食 を使用	day 1
⑤	5%ブドウ糖 レボホリナート	250ml 200mg/m ²	点滴静注	主管	120分	day 1
⑥	5%ブドウ糖 イリノテカン	250ml 150mg/m ²	点滴静注	側管 (⑤と同 時)	120分	day 1
⑦	5%ブドウ糖 5FU	100ml 400mg/m ²	点滴静注	側管 (⑥終了 後連続 で)	15分	day 1
⑧	生理食塩水 5FU	全量で140ml 2400mg/m ²	インフュージョン	主管	46時間	day 1-3
⑨	ポート用生食注シリンジ	20ml	静注	主管		day1. 3

〈備考〉

内服
デカドロン錠 4mg/日 day2,3 朝昼食後
中等度催吐性(3剤)