他049 STZ単剤療法　49-40-0010
レジメン期間：42日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day 29	Day 36
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●
002 注射	冷■プロイメンド点滴静注用（１５０mg） ■アロキシ静注（０．７５mg／５mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（５０ｍＬ） 30　分かけて	1 瓶 1 瓶 1.5 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●
003 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●
004 注射	塩化［Ｎａ］「補正液」１mEq/mL(20mL) ﾘｽｸ 硫酸Ｍｇ補正液1mEq／mL（２０mL） ソルデム３Ａ　輸液（５００ｍｌ） 60　分かけて	20 ml 8 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●
005 注射	ザノサー点滴静注(ｽﾄﾚﾌﾟﾄｿﾞｼﾝ) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて －薬剤部調製(9.5mL/1V)－	1000 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●
006 注射	塩化［Ｎａ］「補正液」１mEq/mL(20mL) ソルデム３Ａ　輸液（５００ｍｌ） 60　分かけて	20 ml 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●	●	●

【レジメンコメント】
※ステロイドによる副作用を考慮し、制吐剤を省いています。
※適宜、制吐剤を処方して下さい。