

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	アバスチン点滴静注（ﾊﾞｽﾁﾝ） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	15 mg/kg １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
003 注射	■アロキシ静注（0. 7 5mg／5 mL） デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて	１ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
005 注射	ゲムシタビン点滴（ｼﾞｴﾏﾋﾞﾝ後） 生理食塩液（１００mｌ）  30 分かけて <L0:1, 000mg/m <sup>2</sup> , L1:900mg/m <sup>2</sup> , L2:800mg/m <sup>2</sup> > －薬剤部調製－	1000 mg/m <sup>2</sup> １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	カルボプラチン点滴（ﾊﾞｰﾗﾌﾟﾗﾁﾝ） ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）  60 分かけて －薬剤部調製－	4 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾝ錠（0. 5mg） 1回8錠、1日2回					