

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	アバスチン点滴静注(ﾊﾞｽﾃｨﾝ) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） （90分→10：00、60分→10：30、30分→11：00） －薬剤部調製－	15 mg/kg １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ボラミン注5 m g（1mL） （腎）ガスター注射液２０m g（２０mg2ml） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｷﾞﾀﾙﾃﾞｨﾍﾞﾙ後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて 11：30	１ A １ A 3 V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて 11：45	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	パクリタキセル注(ｷｸｼｰﾙ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 3 時間で滴下 12：15（※点滴ルートにインラインフィルターを使用） <LO:175mg/m ² , L1:135mg/m ² , L2:110mg/m ² > －薬剤部調製－	175 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞﾗﾌﾟﾗﾁﾝ) ブドウ糖注射液（５％２５０mｌ） 60 分かけて 15：15(max:1,000mg/body) <LO:AUC=6, L1:AUC=5, L2:AUC=4> －薬剤部調製－	6 AUC １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｷﾞﾀﾙﾃﾞｨﾍﾞﾙ錠（0.5mg）１回8錠、１日2回				