

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	ブドウ糖注射液（ 5%100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｰｶﾞｰﾄﾞ]注後発] ブドウ糖注射液（ 5%100mL） 30 分かけて	1 瓶 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ドキシル注(ﾄﾞｷｼﾙﾃﾞｼﾝ) ブドウ糖注射液（ 5%250mL） 60 分かけて【※インラインフィルターは使用禁止】 ※ドキシル投与開始15分前からフローズングローブを装着し、ドキシル投与終了15分後に脱着する。 <L0:30mg/m ² , L1:25mg/m ² , L2:20mg/m ² > －薬剤部調製－	30 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	カルボプラチン点滴(ﾊﾞﾗﾌﾟﾗﾃﾝ) ブドウ糖注射液（ 5%250mL） 60 分かけて <L0:AUC=5, AUC=4, L2:AUC=3> －薬剤部調製－	5 AUC 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ラクテック注（500mL） 90 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※ドキシル投与開始15分前からフローズングローブを装着し、ドキシル投与終了15分後に脱着する。				