

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	ブドウ糖注射液（ 5%100ml） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｻﾞｰﾄﾞﾛﾝ注後発] ブドウ糖注射液（ 5%100ml） 30 分かけて	1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ドキシル注(ﾄﾞｷｼﾙﾍﾞｼﾝ) ブドウ糖注射液（ 5%250ml）  90 分かけて【※インラインフィルターは使用禁止】 ※ドキシル投与開始15分前からフローズングローブを装着し、ドキシル投与終了15分後に脱着する。 <90mg/body未満⇒5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖250ml 点滴(90分). 90mg/body以上⇒5%ﾌﾞﾄﾞｳ糖500ml 点滴(120分).> －薬剤部調製－	40 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（50mL） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	アバスチン点滴静注(ﾊﾞｽﾃﾞｨﾝ) 生理食塩液（100ml）  30 分かけて （初回時90分、2回目60分、以降30分） －薬剤部調製－	15 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 ※ドキシル投与開始15分前からフローズングローブを装着し、 ドキシル投与終了15分後に脱着する。				