

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	ドキソルビシン塩酸塩注（7ドリアン後発） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	25 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	エクザール（E ^ン ア ^ン ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて （Max:10mg/body） －薬剤部調製－	6 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ソル・コーテフ注射用１００m g 側管から （E ^ン ア ^ン 注射終了後に）	１ 瓶	静脈内注射 サイド1	●	●
006 注射	ブレオ（ブ ^レ マイシ ^ン ） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて （Max:15mg/body） －薬剤部調製－	10 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	ソル・コーテフ注射用１００m g 側管から （ブ ^レ 注射終了後に）	１ 瓶	静脈内注射 サイド1	●	●
008 注射	ダカルバジン注 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 3 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	375 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day1, 15）：ア ^ン レ ^ン タ ^ン Cap（125mg）1回1Cap、1日1回（ダ ^ン カルバ ^ン ジン注開始60分前） 制吐療法（Day2-3, 16-17）：ア ^ン レ ^ン タ ^ン Cap（80mg）1回1Cap、1日1回 * ABVd療法の際は、ダカルバジンを250mg/m2に減量					