

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [7ドセトリス注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
003 注射	ドキシルピシン塩酸塩注（7ドリアン後発） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	25 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
004 注射	エクザール（ヒソ7ラチン） 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて (Max:10mg/body) －薬剤部調製－	6 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
005 注射	ダカルバジン注 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 3 時間で滴下 【要】遮光 －薬剤部調製－	375 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●
006 注射	生理食塩液（５０mL） 全開で －薬剤部調製－	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
007 注射	アドセトリス静注（7レンツシマ7ベドチン） 注射用水（２０mｌプラボトル） 生理食塩液（１００mｌ） 30分かけて (10.5mL/1Vで溶解) －薬剤部調製（＊希釈後、濃度が0.4～1.2mg/mLの範囲内 であるか確認する こと！）－	1.2 mg/kg 2 A １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day1, 15）：77ドレ7tantCap（125mg）1回1Cap、1日1回（ダ7カル7ジン注開始60分前） 制吐療法：（Day2-3, 16-17）：77ドレ7tantCap（80mg）1回1Cap、1日1回 ＊A-AVd療法の際は、ダカルバジンを250mg/m2に減量					