

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	１ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ボラミン注５mｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [デ*カ*ロ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ A ３ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（１００mｌ） ３０分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ダ*ラツムマブ*/ホ*ルビアルビタ*ーゼ*) ３～５分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと 一薬剤部調製一	1800 mg/body	皮下注射 一	●
【レジメンコメント】 【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと。 ※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること 【注意】7コース目以降専用のレジメンです。				