血308 DCyBorD療法(Dar皮下注)【全身性ALアミロイドーシス】　【3～6コース目用】　05-13-2200

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
002 注射	アセリオ静注液１０００mgバッグ（100mL） １５分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●	
003 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 A 3 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●	
004 注射	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg100mL[ｶｲﾄﾘﾙ後発] ３０分かけて	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●		●	
005 注射	ダラキューロ配合皮下注(ﾀﾞﾗﾂﾑﾏﾌﾞ/ﾎﾞﾙﾋｱﾙﾛﾆﾀﾞｰｾﾞ) ３～５分かけて皮下注射 ※臍から左又は右に約7.5cmの腹部皮下に投与 ※同一部位への反復注射や同一部位に他の薬剤を投与しないこと －薬剤部調製－	1800 mg/body	皮下注射 －	●		●	
006 注射	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg100mL[ｶｲﾄﾘﾙ後発] デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ ３０分かけて	1 袋 3 V	化学療法点滴 メイン1		●		●
007 注射	エンドキサン注 生理食塩液（２５０ｍＬ） ６０分かけて ダラキューロ投与日は、ダラキューロ投与終了後に投与 (Max:500mg/body) －薬剤部調製－	300 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	●	●	●
008 注射	ベルケイド[皮下](ﾎﾞﾙﾃﾞｿﾞﾐﾌﾞ) 生理食塩液（５ｍｌ） （溶解用：1V/1.2ml） －薬剤部調製－	1.3 mg/㎡ 1.2 ml	皮下注射 －	●	●	●	●

【レジメンコメント】
【内服】ﾚﾅﾃﾞｯｸｽ錠(4mg)　20mg/body Day2, 9, 16, 23
【ダラキューロ皮下注】※同一部位への反復注射は行わないこと。また、同一部位に他の薬剤を投与しないこと
※ダラキューロ投与開始１～３時間前に、解熱鎮痛剤、ステロイド及び抗ヒスタミン剤を投与すること
【注意】3～6コース目専用のレジメンです。