

| Rp  | 薬品／コメント   | 投与量                         | 用法／手技・ルート      | Day<br>1 |
|---|---|-----------------------------|----------------|----------|
| 001<br>注射   | 生理食塩液（１００mｌ）<br>ルートキープ用   | １ 瓶                         | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 002<br>注射   | ■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL）<br>デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｭｸﾞﾛﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００mｌ）<br>30 分かけて                          | １ 瓶<br>１ V<br>１ 瓶           | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 003<br>注射   | ドセタキセル点滴静注<br>ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）<br>60 分かけて<br><L0: 60mg/m <sup>2</sup> , L1: 50mg/m <sup>2</sup> ><br>－薬剤部調製－ | 60 mg/m <sup>2</sup><br>１ 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 004<br>注射   | カルボプラチン点滴（ﾊﾞﾗﾌﾟﾗﾁﾝ）<br>ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ）<br>60 分かけて<br><L0: AUC=6, L1: AUC=5, L2: AUC=4><br>－薬剤部調製－           | 6 AUC<br>１ 瓶                | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 【レジメンコメント】<br>制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｭｸﾞﾛﾝ錠（0. 5mg） 1回8錠、1日2回 |   |                             |                |          |