血285 ベスポンサ単剤（初回又は難治性）　05-08-0290
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 8	Day 15
001 注射	ポララミン注５ｍｇ（1mL） ソル・コーテフ注射用１００ｍｇ 生理食塩液（５０ｍＬ） 30　分かけて	1 Ａ 1 瓶 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
002 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	●
003 注射	ベスポンサ点滴用(ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（５０ｍＬ） 1　時間で滴下 【要】遮光　(調製時及び投与時) 点滴ﾙｰﾄにﾌｨﾙﾀ｢ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ｣使用 （溶解用：1V/4mL） －薬剤部調製－	0.8 mg/㎡ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		
004 注射	ベスポンサ点滴用(ｲﾉﾂｽﾞﾏﾌﾞ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） 生理食塩液（５０ｍＬ） 1　時間で滴下 【要】遮光　(調製時及び投与時) 点滴ﾙｰﾄにﾌｨﾙﾀ｢ﾋﾞｰ･ﾌﾞﾗｳﾝ｣使用 （溶解用：1V/4mL） －薬剤部調製－	0.5 mg/㎡ 1 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	●

【レジメンコメント】

1サイクル目:21～28日間、2サイクル目以降:28日間を1サイクルとする。