泌003 CDDP/GEM療法【GC療法】　35-02-0010

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●	●
002 注射	デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●	●
003 注射	ゲムシタビン点滴(ｼﾞｪﾑｻﾞｰﾙ後) 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて －薬剤部調製－	1000 mg/㎡ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●		●	●
004 注射	ヴィーンＦ輸液（５００ｍｌ） 270 分かけて	2 瓶	化学療法点滴 メイン1		●		
005 注射	■アロキシ静注（０．７５mg／５mL） デキサート注射液6.6mg2mL［ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発］ 生理食塩液（５０ｍＬ） 側管から 30　分かけて	1 瓶 1.5 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 サイド1		●		
006 注射	シスプラチン点滴静注(ﾗﾝﾀﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 側管から 120 分かけて 【要】遮光 －薬剤部調製－	70 mg/㎡ 300 ml	化学療法点滴 サイド1		●		
007 注射	ソルデム３Ａ　輸液（５００ｍｌ） 側管から 60　分かけて	1 袋	化学療法点滴 サイド1		●		
008 注射	ラクテック注（５００ｍｌ） 側管から 60　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 サイド1		●		

【レジメンコメント】

制吐療法(Day2)：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap(125mg) 1回1Cap、1日1回(ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ注開始60分前)

制吐療法(Day3-4)：ｱﾌﾟﾚﾋﾟﾀﾝﾄCap(80mg) 1回1Cap、1日1回

制吐療法(Day3-5)：ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回 (朝夕)