血310 少量キロサイド＋ベネトクラクス併用療法　05-05-0210
レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10
001 注射	キロサイド注(ｼﾀﾗﾋﾞﾝ) -薬剤部調製-	20 mg/㎡	皮下注射 ー	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

【レジメンコメント】
【初回時】　ベネクレクスタ錠 1日1回食後
100mg/body　Day1　→200mg/body Day2　→400mg/body Day3　→600mg/body　Day4～連日
【2コース目以降】　ベネクレクスタ錠 1日1回食後　600mg/body　Day1～連日
.
※強いCYP3A阻害剤(ｸﾗﾘｽﾛﾏｲｼﾝ、ｲﾄﾗｺﾅｿﾞｰﾙ、ﾎﾞﾘｺﾅｿﾞｰﾙ、ﾉｸｻﾌｨﾙ等)併用時、以下の通り、減量すること。
→【初回時】　ベネクレクスタ錠 1日1回食後
10mg/body　Day1　→20mg/body Day2　→50mg/body Day3～連日
【2コース目以降】　ベネクレクスタ錠 1日1回食後　50mg/body　Day1～連日
.
※中等度のCYP阻害剤(ｴﾘｽﾛﾏｲｼﾝ、ｼﾞﾙﾁｱｾﾞﾑ、ﾌﾙｺﾅｿﾞｰﾙ等)と併用時：
→ベネクレクスタ錠は、半量以下に減量すること。