

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠(5mg) 100mg/body 分3 Day1～5	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
002 注射	ｸﾞﾗﾅﾂﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg100mL[ｶｲﾄﾘﾙ後発] 30 分かけて 【内服】ﾎﾟﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｴﾝ錠(60mg) 1錠	1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
003 注射	生理食塩液（５０mL） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
004 注射	ポライビー点滴静注(ﾎﾟﾗｯｽﾞﾏﾌﾞﾎﾟﾄﾞﾁﾝ) 注射用水（２０mｌﾌﾞﾗﾎﾞﾄﾙ） ブドウ糖注射液（５％１００mｌ） 90 分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 （140mg製品：注水7.2mL/1V, 30mg製品：注水1.8mL/1Vで 溶解→20mg/mL） －薬剤部調製（最終濃度0.72～2.7mg/mL）－	1.8 mg/kg 1 A 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
005 注射	生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
006 注射	ドキシルピシン塩酸塩注(ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ後発) 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて －薬剤部調製－	50 mg/m <sup>2</sup> 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	
007 注射	エンドキサン注(ｼｸﾛｵｸｽﾌｧﾐﾄﾞ) 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	750 mg/m <sup>2</sup> 1 袋	化学療法点滴 メイン1	●	
008 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用 【内服】ﾎﾟﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｴﾝ錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●
009 注射	ﾘｯｷｼﾏﾌﾞBS(ﾘｯｷｼﾝ後続) 生理食塩液（２０mｌﾌﾞﾗﾎﾞﾄﾙ） 生理食塩液「テルモパック」（５００mｌ） (初回:50mL/h・2回目以降:100mL/hから開始し、30分毎 に速度を上げる。最大400mL/hまで。) －薬剤部調製－	375 mg/m <sup>2</sup> 1 A 1 袋	化学療法点滴 メイン1		●
【レジメンコメント】 【内服】ﾎﾟﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾟﾛﾌｴﾝ錠(60mg) 1錠 Day1, 2（化学療法剤開始30分前に） 【内服】ﾌﾟﾚﾄﾞﾆﾝ錠(5mg) 100mg/body 分3 Day1～5 【初回時】 心電図モニター：点滴開始から終了まで Day1, 2					