血291 Pola-BR療法【3日レジメン】　05-02-3310
レジメン期間：21日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用 【内服】ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●	●	
002 注射	リツキシマブBS(ﾘﾂｷｻﾝ後発) 生理食塩液「テルモパック」（５００ｍｌ） 生理食塩液（２０ｍｌプラボトル） (初回:50mL/h・2回目以降:100mL/hから開始し、30分毎に速度を上げる。最大400mL/hまで。) －薬剤部調製－	375 mg/㎡ 1 袋 1 Ａ	化学療法点滴 メイン1	●		
003 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1			●
004 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL)[ｱﾛｷｼ後発] デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 瓶 1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	
005 注射	デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ注後発] 生理食塩液（１００ｍｌ） 30　分かけて	1 Ｖ 1 瓶	化学療法点滴 メイン1			●
006 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	
007 注射	ポライビー点滴静注(ﾎﾞﾗｽﾞﾏﾌﾞﾍﾞﾄﾞﾁﾝ) 注射用水（２０ｍｌプラボトル） ブドウ糖注射液（　５％１００ｍｌ） 90　分かけて （初回時 90分、2回目以降30分） ※点滴ルートに0.2ミクロンのインラインフィルターを使用 (140mg製品：注水7.2mL/1V,30mg製品：注水1.8mL/1Vで溶解→20mg/mL) －薬剤部調製(最終濃度0.72～2.7mg/mL)－	1.8 mg/kg 1 Ａ 0.5 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	
008 注射	生理食塩液（５０ｍＬ） 15　分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン1		●	
009 注射	トレアキシン点滴静注液(ﾍﾞﾝﾀﾞﾑｽﾁﾝ) 生理食塩液（２５０ｍＬ） 60　分かけて －薬剤部調製－	90 mg/㎡ 1 袋	化学療法点滴 メイン1		●	●

【レジメンコメント】
【内服】ﾎﾞﾗﾗﾐﾝ錠(2mg) 1錠、ﾛｷｿﾌﾞﾛﾌｪﾝ錠(60mg) 1錠 Day1,2 (化学療法剤開始30分前に)
【初回時】 心電図モニター : 点滴開始から終了まで Day1,2