血348 エプキンリ単剤療法【2～3コース目用】　05-02-3360

レジメン期間：28日

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25
001 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン2	●				●				●				●			
002 注射	プレドニン［水溶性］（２０ｍｇ） 生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	5 Ａ 1 瓶	化学療法点滴 メイン2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
003 注射	生理食塩液（１００ｍｌ） ３０分かけて	1 瓶	化学療法点滴 メイン2	●				●				●				●			
004 注射	エプキンリ皮下注(ｴﾌﾟｺﾘﾀﾏﾌﾞ) 腹部又は左右の大腿部に皮下注射 ※前回の投与後にG2以上のサイトカイン放出症候群が出現した場合、 エプキンリ投与開始30～120分前に、ステロイドを投与すること ※週１回投与では、同一部位への反復注射は避けること －薬剤部調製－	48 mg/body	皮下注射 －	●				●				●				●			

【レジメンコメント】
※前回の投与後にG2以上のサイトカイン放出症候群が出現した場合、エプキンリ投与開始30～120分前に、
ステロイドを投与すること。(必要に応じて、解熱鎮痛剤、抗ヒスタミン剤の投与も検討してください。)
※週１回投与では、同一部位への反復注射は避けること。
G3以下のサイトカイン放出症候群が出現した場合、回復するまで休薬
G4のサイトカイン放出症候群が出現した場合、投与中止
※以下の投与遅延があった場合、サイトカイン放出症候群を軽減するために、1コース目の投与方法に戻して再び投与を開始すること。
48mgの投与間隔が6週間を超えた場合
その後は、予定されていた次の投与コース(投与を延期したコースの次の投与コース)の1日目から投与を再開すること。
＊2～3ｺｰｽ目に使用するレジメンです。