

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	ポララミン注５mｇ（1mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶｰﾄﾞ注後発] 生理食塩液（５０mL） 15 分かけて	１ A １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	アービタックス注射液(ﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞ) 生理食塩液（２５０mL） 2 時間で滴下 －薬剤部調製－	500 mg/m ² １ 袋	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて (最初の15分はC-mabと同速度で点滴)	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	パロノセトロン静注(0.75mg/5mL) [ｱﾛｷｼ後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
007 注射	イリノテカン塩酸塩注(ｶﾝﾌﾟﾄ後発) ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 90 分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶｰﾄﾞ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				