

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [テカトロン注後発] 生理食塩液（100mL） 30 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	レボホリナート点滴静注用(アイボリン後発) ブドウ糖注射液（5%250mL） 2 時間で滴下 <L-OHPと同時に開始> ー薬剤部調製ー	200 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	オキサリプラチン点滴(エルプラット) ブドウ糖注射液（5%250mL） 側管から 2 時間で滴下 ー薬剤部調製ー	85 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
005 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 生理食塩液（50mL） 全開で ー薬剤部調製ー	400 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 輸液（自動計算） 3.0 mL／H 46 時間で滴下 リザーバー使用(コッシュア-フューサー-A) (生食を加え、総用量135mlに調製) ー薬剤部調製ー	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：テカトロン錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				