

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（１００mｌ） ルートキープ用	１ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0. 75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｸﾃﾞｭﾝ注後発] 生理食塩液（１００mｌ） 30 分かけて	１ 瓶 １ V １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	レボホリナート点滴静注用(ｱｲﾂﾎﾞﾘﾝ後発) ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 2 時間で滴下 <CPT-11と同時に開始> －薬剤部調製－	200 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	イリフテカン塩酸塩注(ｶﾌﾟﾃﾞｷﾝ後発) ブドウ糖注射液（ ５％２５０mｌ） 側管から 90 分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
005 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 生理食塩液（５０mL） 全開で －薬剤部調製－	400 mg/m ² １ 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	フルオロウラシル注(5Fu注後発) 輸液（自動計算） 3.0 mｌ／H 46 時間で滴下 ﾘｻﾞｰﾊﾟｰ使用(ﾆﾌﾟﾛｼｭｱｰﾌｭｰｻﾞｰ-A) (生食を加え、総用量135mlに調製) －薬剤部調製－	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｸﾃﾞｭﾝ錠(0.5mg) 1回8錠、1日2回				