

| Rp  | 薬品／コメント  | 投与量                          | 用法／手技・ルート      | Day<br>1 |
|---|--|------------------------------|----------------|----------|
| 001<br>注射   | 生理食塩液（１００mｌ）<br><br>ルートキープ用<br>【内服】Day1-14 TS-1Cap、80～120mg/分2/day(朝夕食後)                 | １ 瓶                          | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 002<br>注射   | ■アロキシ静注（0. 7 5 mg／5 mL）<br>デキサート注射液6. 6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾄﾞﾝ注後発]<br>生理食塩液（１００mｌ）<br><br>30 分かけて | １ 瓶<br>１ V<br>１ 瓶            | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 003<br>注射   | オキサリプラチン点滴(ﾏﾙﾌﾟﾗｯﾄ)<br>ブドウ糖注射液（ ５％５００mｌ）<br><br>2 時間で滴下<br>－薬剤部調製－                       | 130 mg/m <sup>2</sup><br>１ 瓶 | 化学療法点滴<br>メイン1 | ●        |
| 【レジメンコメント】<br>制吐療法 (Day2-3)：ﾃﾞｭｶﾄﾞﾝ錠 (0. 5mg) １回8錠、1日2回 |  |                              |                |          |