

Rp	薬品／コメント	投与量	用法／手技・ルート	Day 1
001 注射	生理食塩液（100mL） ルートキープ用 ※点滴ルートにインラインフィルターを使用	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
002 注射	■アロキシ静注（0.75mg／5mL） デキサート注射液6.6mg2mL [ﾃﾞｭｶﾞｰﾝ注後発] 生理食塩液（50mL） 15 分かけて	1 瓶 1 V 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
003 注射	ザルトラップ点滴（ｱﾌﾘﾊﾞﾙﾄﾞ） 生理食塩液（100mL） 60 分かけて ※点滴ルートにインラインフィルターを使用 －薬剤部調製（最終濃度：0.6～8mg/mL）－	4 mg/kg 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
004 注射	生理食塩液（50mL） 全開で	1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
005 注射	レボホリナート点滴静注用（ｱｲﾊﾞｰﾘﾝ後発） ブドウ糖注射液（ 5％250mL） 2 時間で滴下 ＜CPT-11と同時に開始＞ －薬剤部調製－	200 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
006 注射	イリノテカン塩酸塩注（ｶﾝﾌﾟﾄ後発） ブドウ糖注射液（ 5％250mL） 側管から 90 分かけて －薬剤部調製－	150 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 サイド1	●
007 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 生理食塩液（50mL） 全開で －薬剤部調製－	400 mg/m ² 1 瓶	化学療法点滴 メイン1	●
008 注射	フルオロウラシル注（5Fu注後発） 輸液（自動計算） 3.0 mL／H 46 時間で滴下 ﾘｻﾞｰﾊﾞｰ使用（ﾆﾌﾞﾛｼｭｱｰﾌｭｰｻﾞｰA） （生食を加え、総用量135mlに調製） －薬剤部調製－	2400 mg/m ² 自動	化学療法点滴 メイン1	●
【レジメンコメント】 制吐療法（Day2-3）：ﾃﾞｭｶﾞｰﾝ錠（0.5mg） 1回8錠、1日2回				